

OUTCAST® FORMICHE

Esca in Gel (E) predosata

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA (PT18):
n° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Indoxicarb	0,11 % (S:R 75:25)
Coformalanti q.b. a	100 g

CARATTERISTICHE

Outcast® Formiche è stato specificamente formulato per essere attrattivo per un'ampia gamma di specie di formiche infestanti: contiene il principio attivo indoxacarb, un insetticida potente e non-repellente. Il lieve ritardo nella mortalità causata dal principio attivo incoraggia le formiche a consumare l'esca e tornare ai siti di nidificazione in modo da contaminare le altre formiche presenti nella colonia, consentendo quindi una significativa riduzione dei livelli d'infestazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere le stazioni di esca al termine del trattamento e smaltirle secondo le istruzioni seguenti.

Se l'infestazione persiste nonostante si seguano le istruzioni in etichetta, contattare un disinfestatore professionista.

Posizionare la stazione dell'esca in aree dove sono presenti tracce di formiche attive, nidi o altre aree infestate o aree sospettate di essere infestate

Rimuovere le fonti di cibo alternative che potrebbero essere in concorrenza dalle aree vicine.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

DOSI D'IMPIEGO

- 0,1 g-0,5 g di prodotto/m² nella stazione esca vicino a ingressi di nidi, tracce di formiche, aree di foraggiamento.
- Tra 1 e 5 stazioni di esche per 40 m² nelle aree in cui sono attive le formiche (per ottenere una dose di applicazione massima di 0,5 g di esche gel per m², ad esempio 4 stazioni di esche contenenti 5 g per 40 m²)

Le stazioni dell'esca possono essere sostituite dopo un minimo di 7 giorni.

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Non aprire le stazioni di esche e non maneggiare il gel.

Posizionare le esche solo in aree inaccessibili a neonati, bambini, animali da compagnia e animali non bersaglio.

Posizionare le stazioni di esche lontano da cibi, bevande e mangimi, nonché da utensili o superfici che sono a contatto con questi.

Per uso esterno, applicare su superficie coperta, in zone non soggette a sommersione o bagnatura, cioè al riparo da pioggia, allagamenti e acque di pulizia.

Non applicare all'interno e intorno agli scarichi.

Questo prodotto biocida contiene Indoxacarb che è pericoloso per le api.

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Maggio 2023



INFESTANTI TARGET

INSETTI STRISCIANTI

Formiche (tra cui *Lasius niger*)

ATTREZZATURE

Prodotto da usare tal quale